

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.




FOIE et VOIES BILIAIRES

DR y BOUDIAF

Hôpital Neffissa HAMOUD

Service de cytologie du PR ABDELLALI

LE FOIE



INTRODUCTION

Le foie possède toutes les caractéristiques d'une glande **exocrine** et d'une glande **endocrine** .

Ces deux fonctions sont assurées par **un seul type** cellulaire .

C'est une **glande amphicrine homotypique** .

Les hépatocytes possèdent une double polarité :

- l'une **vasculaire** correspondant à la fonction endocrine .

- l'autre **canaliculaire** correspondant à la sécrétion biliaire .

de ce fait on qualifie ces cellules de **cellules amphicrines** .

RAPPEL EMBRYOLOGIQUE

origine entoblastique

ORGANISATION DU PARENCHYME HEPATIQUE

Sur une coupe de foie observée en mo au fble grsst
on identifie **2** constituants :

1-les formations conjonctives

2-le parenchyme glandulaire .

1-les formations conjonctives :

Ceux sont les **cloisons** et les **travées** issues de la capsule de GLISSON .ceux sont des voies de cheminement des vaisseaux sanguins , des nerfs et des conduits biliaires intra hépatiques .

2-le parenchyme glandulaire

•


Découpé par des **travées** conjonctives incomplètes en **lobules** (unité histologique du foie .) .

Chaque lobule apparaît :

-grossièrement polygonale(1mm en moyenne de diamètre) .

-limité incomplètement par des plages conjonctives triangulaires ou quadrangulaires appelé **espace porte ou espace de KIERNAN**.

-centre par une lacune vasculaire : la **veine centro lobulaire**.



Dans chaque espace de KIERNANN


on reconnaît 4 sortes d'éléments :

-des **vaisseaux sanguins** : branches de l'artère hépatique ou de la veine porte .

-des fentes ou **capillaires lymphatiques** drainés par le réseau lymphatique de la capsule de GLISSON .

-des **voies biliaires inter lobulaires** : sections de conduits à lumière large bordés d'un épithélium simple .

-des **fibres nerveuse amyéliniques** destinées à la paroi des vaisseaux sanguins et des voies biliaires inter lobulaires .



STRUCTURES HISTOLOGIQUES DU PARENCHYME INTRALOBULAIRE

Sur une coupe de foie observée en mo :

Le parenchyme intra lobulaire s'étend de la veine Centro lobulaire aux espaces portes .


On reconnaît 4 sortes d'éléments :

-**les cellules hépatiques** ou hépatocytes disposées en travées de REMACK .

-**les capillaires sanguins** ou capillaires radies du foie .

-**la trame conjonctive** de soutien appelée encore fibres grillagées .

-**les canalicules biliaires**



La cellule hépatique

-en mo :

-forme d'un **polyèdre** de 6 à 8 faces

-**présent e**2 faces bordées par un capillaire : les pôles vasculaires , les autres faces sont appliquées contre celles des cellules voisines et creusées d'une gouttière pour le canalicule biliaire.


-**le cytoplasme** basophile renferme 1 à 2 noyaux nucléoles .

Des techniques spéciales mettent en évidence

-un chondriome abondant ,

-un GOLGI supra nucléaire et

-divers enclaves lipidiques (glycogène – lipides – grains siderophiles).




La cellule hépatique:me

-la **membrane plasmique** est hérissée de microvillosités du cote du capillaire sinusoïde (pole vasculaire de la cellule) et du cote du canalicule biliaire (pole biliaire de la cellule) .

-sur le **versant sinusoïdal** , la membrane cellulaire de l'hépatocyte est séparé de l'endothélium capillaire par un espace perisinusoïdal ou espace de DISSE .


-Les **canalicules biliaires** sont formés par des dépressions en gouttière de la membrane plasmique d'hépatocytes adjacents permettant le passage de la bile .

le cytoplasme est riche en divers organites .



2 – les capillaires radiés ou sinusoides


Logés entre les travées de REMAK , anastomosés entre eux s'étendent des veines perilobulaires à la veine centro lobulaire à laquelle ils donnent naissance au sommet du lobule par un dispositif stellaire : l'étoile de HERING.



Les capillaires sinusoides:me


la paroi de ces capillaires est **discontinue**,
l'endothélium est fenêtré
dépourvu de membrane
basale.

L'espace pericapillaire ou
espace de DISSE sépare
l'endothélium de la cellule
hépatique. Il renferme des
cellules spécialisées dans
le stockage des graisses. :
les cellules de ITO.




la cellule de KUPFFER

- se situe dans la lumière des capillaires sinusoïdes .
- de forme stellaire ou rameuse , fait saillie dans la lumière du capillaire
- son cytoplasme est riche en lysosomes et phagosomes
- c'est un macrophage doué de phagocytose
- intervient dans le métabolisme du fer .la dégradation de l'hémoglobine ,dans la biligenèse et l'épuration des substances toxiques du sang



3- la trame conjonctive de soutien .

-Examinée au mo avec des techniques spéciales apparaît formées de fibres collagènes , continues d'un lobule à l'autre , unissant les fibres conjonctives de l'espace de KIERNAN au dispositif fibreux de la paroi de la veine centro lobulaire




Les fibres grillagées

de la trame de soutien du parenchyme hépatique se repartissent en :

-**fibres radiées** : fibres de collagène .

-**fibres en treillis** : fibres de réticuline encerclant +ou- les travées de REMACK et les capillaires sinusoïdes .


-**les fibres unissantes** : fibres de réticulines solidarissant entre elles les fibres en treillis .



4 – canalicules biliaires :

Ou **capillicules biliaires** intra-lobulaires ,fins conduits intercellulaires situés entre les faces ou arêtes contigües de 2 ou 3 hépatocytes adjacents .


Ces capillicules sans paroi propre sont de simples dépressions en gouttière des parois des cellules hépatiques permettant le passage de la bile



Les canalicules

A la périphérie du lobule rejoignent le canal biliaire de l'espace de KIERNAN par des canaux d'unions appelés passages de HERING .


La paroi de ces derniers est faite d'un épithélium cubique ou cylindrique reposant sur une vitrée



Au niveau du canalicule biliaire la me montre que:

1-la membrane plasmique des hépatocytes limitant un canalicule biliaires est hérissée de microvillosités .

2-aux points de jonction des cellules hépatiques péricanaliculaires existent **des desmosomes** qui isolent le canalicule du reste de l'espace intercellulaire.



B-LES VOIES BILIAIRES

La paroi des voies biliaires extra- hépatiques

est composée de 3 tuniques :

1-une muqueuse :

-un épithélium uni stratifié à cellules prismatiques à plateau strie au pôle apical .


-un chorion conjonctivo vasculaire avec des glandes tubuleuses ramifiées de type muqueux

2- une musculuse :

Faite de fibres musculaires lisses orientées de façon diverse formant des sphincters à l'origine du canal cystique (sphincter de LUTKINS) et à la terminaison du canal cholédoque (**sphincter d'ODDI**) .

3 – une adventice :

Conjonctivo – élastique



La paroi de la vésicule biliaire

1 – au niveau de la muqueuse :

- présence de nombreux replis muqueux
- l'épithélium est simple , prismatique contient en outre des cellules caliciformes à mucus ouvertes et de rares cellules argentaffines .

2 – au niveau de la musculuse :

- une couche plexi forme dans le corps de la vésicule .
- une couche longitudinale interne et circulaire externe au niveau du col de l'organe .

3 – l'adventice est remplacé par le feuillet viscéral du péritoine sur la face péritonéale de la vésicule biliaire .

VASCULARISATION SANGUINE DU LOBULE HEPATIQUE.

Double système vasculaire sanguin .

1-l'un fonctionnel : purement veineux issu de la veine porte :
système porto-sus-hépatique .


2-l'autre nourricier arterio- veineux issu des ramifications
inter lobulaires des branches de l'artère hépatique :
système hépato-sus –hépatique .

système porto-sus-hépatique

-correspond **au riche réseau de capillaires sinusoïdes** situés entre les travées de REMACK .


-Ce réseau est drainé par la veine Centro-lobulaire qui chemine dans l'axe du lobule rejoint une veine sus-lobulaire .

-De la réunion des veines sus-lobulaires naissent les veines sus-lobaires hépatiques (2 à 4) qui se terminent dans la veine cave inférieure .



le système hépato-sus –hépatique.

A la périphérie du lobule , chaque branche artérielle irrigue par des ramuscules la paroi des vaisseaux portes et celle des conduits biliaires des espaces de KIERNAN et fournit un contingent d'artérioles qui sont à l'origine de capillaires intra-lobulaires qui s'abouchent dans les capillaires sinusoides



Au total : la circulation de retour (s'effectuant par les veines sus hépatiques)est commune aux deux systèmes vasculaires intra-lobulaires.

HISTOPHYSIOLOGIE

Le lobule hépatique fonctionne de la périphérie vers le centre comme un accumulateur à 3 étages

.on observe **3 zones à activité différente** :

- une zone périphérique** ou periportale qui est la zone cytogene. Du lobule faite de cellules jeunes en activité permanente .
- une zone moyenne** fonctionnant uniquement dans les phases digestives .
- une zone centrale** dite péri-sus-hépatique qui est une zone de suppléance faite de cellules âgées et peu résistantes n'intervient qu'en cas de surcharge fonctionnelle.

Sur le plan cytophysiologique la cellule hépatique assure de nombreuses fonctions métaboliques :

- synthèse de : lipoprotéines , sels biliaires etc.
- mise en réserve ou stockage .
- dégradation .
- détoxication ou épuration du sang et de la bile .

Dans la biligenèse

Neutralise les substances toxiques permet l'épuration du sang ..